



Pas de terre à bain les premiers jours

Il est préférable de retirer le bac de «terre à bain» durant les premiers jours d'élevage des petits. Cela évite les complications génitales pour la femelle et oculaires pour les petits. La «terre à bain» peut être proposée ensuite de manière ponctuelle chaque jour jusqu'au premier mois des petits.

► En captivité, le sevrage a lieu vers 5 à 6 semaines.



interactions, intervient lorsqu'un petit s'égare ou agresse sa fratrie et subvient aussi à leurs besoins en allant leur chercher de la nourriture ou des friandises.

Le sevrage

Le sevrage a lieu vers 5 à 6 semaines. La mère s'impatiente vis-à-vis de ses petits et les repousse lorsqu'ils viennent téter. Ils s'habituent alors à ne consommer qu'une alimentation solide.

La séparation des petits et des parents est très tardive à l'état sauvage. En effet, ceux-ci ne quittent le cocon familial qu'avec le début de la nouvelle saison de reproduction : ils ont alors 9 mois révolus. En captivité, le seul moyen de réguler les accouplements est de séparer dès le sevrage les petites femelles des mâles adultes. Les petits mâles peuvent éventuellement rester un peu plus longtemps. La séparation des petits et des parents est souvent une période difficile, pour le propriétaire comme pour les parents. Ceux-ci peuvent parfois présenter des symptômes assimilables à une dépression : manque d'entrain, baisse d'appétit...

Une fois cette première expérience de reproduction réalisée, il est souhaitable de laisser les octodons mâles et femelles vivre ensemble. Ces rongeurs sociaux apprécient la vie en groupes (pourvu que l'espace fourni soit de taille adaptée). La stérilisation des mâles permet de prévenir les accouplements non désirés. ■

Les petits octodons, des adultes miniatures !

Malgré leur faible poids (14 à 20 g à la naissance), les petits octodons s'apparentent à des adultes miniatures et sont prêts à parcourir le monde quelques heures après leur venue au monde.

Dès le premier jour, les yeux des petits octodons s'entrouvrent, mais l'ouverture complète n'a lieu que 48 heures plus tard. Ils consomment rapidement le lait produit par les huit mamelles de leur mère.

À cette période, l'attachement entre la femelle et ses bébés est fragile et une intervention humaine peut être néfaste.

À l'issue de la première semaine, les femelles les plus tolérantes peuvent accepter la manipulation des petits par le propriétaire auquel elles sont attachées.

Lorsque plusieurs femelles sont hébergées ensemble, il arrive fréquemment qu'elles s'entraident pour l'élevage des petits. De même, le père est très actif et participe à l'éducation de ces derniers, il régule les