



Seconde partie Dans le précédent numéro, nous avons abordé les bases de la reproduction du chinchilla et les précautions à prendre. De la même façon, lorsque la mise bas arrive, la vigilance s'impose !



Chinchilla

La mise bas et ses complications

Quelques jours avant la mise bas, il est possible d'observer chez la femelle un relâchement du bassin et l'ouverture modérée de la fente vaginale. La femelle peut également se montrer plus agressive. Contrairement aux autres rongeurs, elle ne construit pas de nid.

La mise bas a lieu le plus souvent au petit matin et se déroule en trois à quatre heures. La femelle consomme les placentas mais aussi les fœtus mort-nés : des traces de sang sont visibles sur les pattes et le nez. Si des efforts expulsifs persistent au-delà de quelques heures, un contrôle vétérinaire est nécessaire. Des dystocies (mises bas difficiles ou anormales) sont assez fréquemment observées.

Quelques précautions

À l'issue de la mise bas, la femelle est de nouveau fertile (œstrus post-partum) : mieux vaut isoler le mâle durant les cinq premiers jours de manière à éviter une nouvelle portée. Il pourra ensuite être réintroduit et participer ainsi à l'éducation des petits.

Il faut retirer la terre à bain durant les premiers jours, puis ne la proposer que de manière surveillée chaque jour durant l'élevage des petits. Cela permet de limiter le risque d'infections génitales chez la mère et de troubles oculaires et respiratoires chez les jeunes.

Soins aux nouveau-nés

Les jeunes chinchillas sont nidifuges : ils naissent avec une fourrure épaisse et quelques dents. Leurs yeux s'ouvrent rapide-

ment après la naissance. Pesant à peine un dixième du poids de leurs parents (30 à 50g), ils sont très vite autonomes ; ils goûtent à l'aliment solide de leur mère après leur naissance. L'élevage des petits dure six à huit semaines. La séparation des mâles et des femelles est recommandée après dix semaines.

Les éventuelles complications

◆ **La dystocie** : la mise bas peut se compliquer lorsque la femelle est épuisée par des efforts infructueux. S'il n'y a pas d'obstacle mécanique, un traitement médical peut faciliter la naissance des petits. Cependant, si le bassin de la mère est trop étroit ou que l'un des fœtus se présente mal, une césarienne doit être effectuée en urgence pour sauver la mère et ses petits.

◆ **L'abandon de portée et/ou cannibalisme** : occasionnellement, la mère peut toiletter excessivement ses petits, jusqu'à l'amputation des membres, ou les aban-

donner. Cela peut être d'origine organique (carences minérales ou protéiques, défaut d'abreuvement), environnementale (parfums ou odeurs humaines interférant avec la reconnaissance des petits) ou psychologique (stress maternel).

L'élevage artificiel

Les jeunes orphelins peuvent être déposés auprès d'une mère ayant mis bas récemment (des chinchillas placés auprès de cobayes ont même survécu avec succès). L'allaitement avec un lait maternisé pour chatons est aussi possible, toutes les deux heures environ durant les premiers jours, puis toutes les trois à quatre heures dès que les jeunes picorent de la nourriture solide.

Le sevrage est effectué de manière précoce, dès l'âge de 4 semaines. Après chaque repas, le réflexe périnéal est stimulé en passant un coton humide sur la région génitale des petits et en massant doucement le ventre. ■

Responsabilité des propriétaires

Même si les chinchillas ne sont pas les rongeurs les plus prolifiques, la mère peut mettre au monde jusqu'à cinq petits, deux fois par an, pour lesquels il convient de trouver une famille d'accueil à chaque fois.

La séparation des mâles et des femelles ou la stérilisation sont indispensables pour ne pas engendrer surpopulation, conflits, maladies et abandons.

